

**Atestado médico de enquadramento no Grupo Prioritário de Comorbidades do
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19**

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome Completo:

CPF:

Data de Nascimento:

Endereço:

ATESTADO

Atesto, a pedido do paciente acima identificado, para os devidos fins e sob as penas da lei, que o mesmo se enquadra no Grupo de Comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 (Nota Técnica nº 467/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS e Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 de 18/01/2021), possuindo as seguintes comorbidades:

Patologia:

CID:

Patologia:

CID:

Patologia:

CID:

Patologia:

CID:

Preencher com X se a resposta for SIM

Gestante

Acamado

MEDICAMENTOS EM USO

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO DECLARANTE

Nome Completo:

CRM:

Telefone de Contato:

ASSINATURAS

Paciente

Médico

Assinatura do paciente e/ou responsável idêntico ao documento de identificação.

Carimbo e assinatura do médico idêntica ao da Carteira do CRM ou assinatura eletrônica.

Data de emissão

IDENTIFICAÇÃO DA COMORBIDADE

Grupo de Comorbidade	Descrição
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes.
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidades.
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

DOENÇAS CARDIOVASCULARES	
Grupo de Comorbidade	Descrição
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada, em estágios B, C ou D. Independente de classe funcional da <i>New York Heart Association</i>
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária
Cardiopatia hipertensiva	Cardiopatia hipertensiva, (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica: estenose ou insuficiência mitral, estenose ou insuficiência pulmonar, estenose ou insuficiência tricúspide, outras).
Miocardopatias e Pericardiopatias	Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenotipos, pericardite crônica, cardiopatia reumática
Doenças da Aorta, dos Grandes vasos Fistulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais e outras).
Cardiopatias congênita no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca, arritmias; comprometimento miocárdico.
Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas: a dispositivos cardíacos Implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, resincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório, demência vascular
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m ³) e/ou síndrome nefrótica
Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 <350 Células/mm ³ , doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoides e/ou ciclofosfamida, demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses neoplasias hematológicas
Anemia falciforme	Anemia falciforme
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
Síndrome de down	Trissomia do cromossomo 21
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 - Nota Orientativa - SES/CI-COVID-19.